




EFFECTIVIDAD DE LAS TÉCNICAS ANALGÉSICAS REGIONALES EN EL POSTOPERATORIO INMEDIATO DE CIRUGÍA TORÁCICA: SERIE DE CASOS.


Castro Rivera Nicolás; Naranjo Ceballos Ana (Hospital Regional Universitario de Málaga)

INTRODUCCIÓN.

El dolor agudo es común en pacientes intervenidos de cirugía torácica y genera múltiples efectos adversos postoperatorios, aunque la cirugía toracoscópica asistida por video (VATS) ha conseguido disminuirlo. Analgésicamente, la epidural torácica ha sido el Gold standar en este tipo de cirugías, sin embargo, actualmente optamos por bloqueos regionales, nuevas técnicas de elección con menores efectos indeseados.

OBJETIVOS.

Evaluar el grado de dolor posquirúrgico en pacientes sometidos a cirugía torácica programada y describir diferencias entre las variables estudiadas.




(Bloqueo paravertebral ecoguiado.)

MATERIAL Y METODOS.

Reunimos una serie de 12 casos preliminares mediante muestreo sistemático de pacientes sometidos a cirugía VATS programada durante enero y febrero de 2025, utilizándose anestesia combinada que incluía técnica regional (bloqueo paravertebral y/o bloqueo del plano erector espinal) y analgesia intravenosa. El análisis descriptivo realizado con el programa SPSS.

RESULTADOS.



CONCLUSIONES.

En nuestra muestra hasta un 75% requirió rescate, siendo el 50% entre la 1-6h postoperatoria, si bien la cifra parece elevada, el EVA medio fue de 4, 83 y no parece repercutir en el inicio a la bipedestación. Estas conclusiones pueden estar influenciadas por el limitado número de pacientes por lo que se hace necesario un estudio a mayor escala que contraste estas hipótesis preliminares.

BIBLIOGRAFIA.

