





ESTUDIO DEL USO DEL FENTANILO EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO Y SU POTENCIAL DE ADICCIÓN

Berlanga García, P; del Pino Soriano, H; Márquez Garrido, GM, Salvador Fernández, M; Herrera Merino, N, García Rueda, A.

INTRODUCCIÓN

- Incremento exponencial en la prescripción → DCNO → parche transdérmico. Mayor libertad, uso crónico.
- 60% de las prescripciones están fuera de indicación.
- Abuso y adicción: liberación rápida (DCO).



OBJETIVOS:

- Examinar el impacto del abuso de fentanilo en la salud pública a nivel global y compararlo con la situación en España.
- Identificar factores de riesgo
- Revisar y evaluar las medidas de prevención y control existentes

FACTORES DE RIESGO DE ADICCIÓN A FENTANILO

FACTOR DE RIESGO	Sullivan et al.(38)	Manchikanti et al. (39)
Abuso de sustancias	Identificado	OR = 3.55; IC 95%: 2.62–4.82
Trastornos psiquiátricos	Identificado	OR = 2.45; IC 95%: 1.91–3.15
Edad joven	Identificado	OR = 2.19; IC 95%: 1.81–2.64
Sexo masculino	No especificado	OR = 1.23; IC 95%: 1.10–1.36
Entorno social/familiar adverso	Identificado	No cuantificado

COMPARACIÓN MODELOS DE PREVENCIÓN EEUU VS ESPAÑA

	EE.UU	ESPAÑA
Medidas implementadas	-Distribución amplia de naloxona. -Educación comunitaria. -Acceso a tratamientos basados en evidencia	-Controles estrictos en prescripción. -Dispensación hospitalaria exclusiva. -Formación especializada de profesionales.
Enfoque de la intervención	Basado en datos epidemiológicos en tiempo real.	Enfoque preventivo de salud pública.
Prescripción del fentanilo	Requiere capacitación en pautas seguras.	Restringida a uso hospitalario desde 2021.
Resultados principales	-Reducción del 24% en muertes por sobredosis en 2025. -Más de 27.000 vidas salvadas al año.	-Solo 379 g de fentanilo incautados (2017-2022). -Tasa de mortalidad: 0,03 por 100.000 (2021).

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN:

- Programas de revisión de prescripción AP y AH. Mejora ámbito tecnológico.
- Limitación prescripciones de liberación inmediata exclusivamente al tratamiento del dolor irruptivo oncológico.
- Formación continuada de profesionales sanitarios. Campaña 2024 Ministerio Sanidad.

CONCLUSIONES: aumento exponencial de fentanilo de liberación transdérmica, escaso poder de adicción. Detección de factores de riesgo de abuso de fentanilo en pacientes susceptibles. Empleo de estrategias de prevención. Elaboración propia de herramientas y protocolos de prescripción y seguimiento de pacientes.