


## TRATAMIENTO DEL DOLOR NEUROPÁTICO POSTHERNIORRAFIA CON PARCHE DE CAPSAICINA

A Basquero, L Arias, M Yus, AM Garcia Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro)

Estudio retrospectivo con un análisis cuantitativo del dolor incluyendo pacientes intervenidos en de hernia inguinal no laparoscópica desde Enero 2023 a Diciembre 2024 .



Evolución de la zona del dolor tras 2 aplicaciones



RESULTADO

En el 55 % de los casos hay mejoría del dolor mayor a un 40% de su EVA basal ya sea en la disminución de la zona afectada o disminución en la intensidad.

Jonson, M Et all . Interrelaciones NANDA, NOC y Nic 2ª e d Barcelona ; Elsevier Mosby; 2007.  
Martinez Ripol, P. Ribera Camadas, MV ww.msmanuals.com [https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-argentina-301-articulo-tratamiento-del-dolor-neuropaticorevision-S1853002811001108#:~:text=D.M Alcántara-Montero A, Pacheco-de Vasconcelos SR. Abordaje farmacológico del dolor neuropático: pasado, presente y futuro. Rev Neurol 2022;74 \(08\):269-279](https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-argentina-301-articulo-tratamiento-del-dolor-neuropaticorevision-S1853002811001108#:~:text=D.M Alcántara-Montero A, Pacheco-de Vasconcelos SR. Abordaje farmacológico del dolor neuropático: pasado, presente y futuro. Rev Neurol 2022;74 (08):269-279)